

Jonslia, sør

Id:	BN00088349
Områdenavn:	Jonslia, sør
Kommuner:	Indre Fosen
Naturtype:	Beiteskog
Utforming:	Beiteskog
Verdi:	Viktig
Utvalgt naturtype:	Nei
Registreringdato:	19.09.2012
Nøyaktighetsklasse:	< 20 m
Tilstand:	Svak hevd
MOB-Land prioritet:	G Ikke vurdert
Modellert:	Nei
Gjennomsnittsdyp	
Forvaltningsplan:	Nei
Forvaltningsavtale:	0
Forvaltningsavtale inngått	
Forvaltningsavtale utløper	
Bruk	
Påvirkningsfaktor	

Verdibegrunnelse: Området er skjøttet ved beiting, og er i middels god hevd. Lokaliteten er liten, og trues av gjengroing, men fremviser likevel et overraskende stort artsmangfold av beitemarkssopp. Naturtypen beiteskog er rødlistet som nær truet (NT). Et ganske stort artsmangfold av karplanter og funn av rødlistet beitemarkssopp gjør at verdien settes til; Viktig – B.

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Solfrid Helene Lien Langmo, Bioreg AS, 05.04.2013, basert på feltarbeid 19.09.2012 av Øystein Folden og Solfrid Helene Lien Langmo. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i forbindelse med supplerende naturtypekartlegging i Rissa kommune. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere.

Beliggenhet: Lokaliteten ligger ca 6 km nord for Stadsbygd sentrum, og omfatter deler av innmarka sør for Jonslia i Rissa kommune. Omkringingliggende arealer består mest av middelaldrende løvblandingsskog med bjørk som dominerende treslag, i tillegg til noe gran. Lokaliteten er ca 130 meter lang, og strekker seg i all hovedsak fra nord mot sør. Lokaliteten er for det meste nordvestvendt og ligger på toppen av en ås med slake skråninger og et flatere parti i nord. I følge berggrunnskartet er det glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt som dominerer berggrunnen her. Moen (1998) plasserer lokaliteten i klart oseanisk seksjon (O2). Samme kilde plasserer lokaliteten i mellomboreal vegetasjonssone.

Naturtyper: Lokaliteten er avgrenset som beiteskog (D06) (100 %). Det har trolig vært langt åpnere her tidligere, men en del storvokst skog og eldre trær vitner om at det har vært skog her i lang tid. Vegetasjonen innenfor lokaliteten består for det aller meste av blåbærskog (T23-1) (etter NiN) (40%) der skogen er etablert. I mer åpne områder dominerer fremdeles engvegetasjonen. Denne er, etter DN-håndbok 13, av typene svak lågurtbeiteeng (D0415) (10%) i nord og svak lågurt-beitefukteng (D0418) (50%) i de resterende åpne områdene.

Artsmangfold: Lokaliteten er dominert av arter som blåklokke, tepperot, tveskjeggveronika, ryllik, blåbær, tyttebær, finnskjegg, sauesvingel og sølvbunke. I bunnsjiktet dominerer engkransmose. Det

ble registrert en del beitemarkssopp som gul vokssopp, honningsvokssopp, engvokssopp, ubestemt jordtunge og musserongvokssopp (NT). En vurderer også potensialet for flere arter beitemarkssopp å være til stede her. En del gran, einer og yngre bjørk inngår i lokaliteten.

Påvirkning: Området er beitet med sau og i middels hevd. En del einer, bjørk og gran vitner om pågående gjengroing. Lokaliteten bør ikke gjødsles, pløyes eller sprøytes.

Fremmede arter: Ingen ble observert.

Skjøtsel: Med ytterligere gjengroing vil beiteskogkvalitetene bli borte. Det er derfor nødvendig å ta ut en del av skogen over litt tid uten at det blir store plutselige endringer. Hogstavfallet bør i så fall fjernes eller i det minste samles sammen. Litt beiting med storfe år om annet uten at det blir mye opptråkka, vil være en fordel.

Landskap: Områdene rundt Jonslia har tidligere trolig vært en del av et større kulturlandskap ved Husbotn. I dag er mye av dette grodd igjen eller tilplantet med gran og tilknytningen til dette landskapet er svekket. Rundt gården i Jonslia er det imidlertid fremdeles beitet med sau både på deler av innmarka og delvis også i skogen.

Mangler:

Totalareal: 6,5 daa

Jonslia, vest

Id:	BN00088354
Områdenavn:	Jonslia, vest
Kommuner:	Indre Fosen
Naturtype:	Naturbeitemark
Utforming:	Svak lågurteng
Verdi:	Viktig
Utvalgt naturtype:	Nei
Registreringdato:	19.09.2012
Nøyaktighetsklasse:	< 20 m
Tilstand:	God hevd
MOB-Land prioritet:	G Ikke vurdert
Modellert:	Nei
Gjennomsnittsdyp	
Forvaltningsplan:	Nei
Forvaltningsavtale:	0
Forvaltningsavtale inngått:	
Forvaltningsavtale utløper:	
Bruk:	
Påvirkningsfaktor:	

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er noe gjengrodd, har middels beitetrykk og ingen spor av gjødsling. Den er lite prega av fremmede arter og er middels stor, noe som sammen med registrering av rødlistet beitemarkssopp gir verdien; Viktig – B.

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Solfrid Helene Lien Langmo, Bioereg AS, 05.04.2013, basert på feltarbeid 19.09.2012 av Øystein Folden og Solfrid Helene Lien Langmo. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i forbindelse med supplerende naturtypekartlegging i Rissa kommune. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere.

Beliggenhet: Lokaliteten ligger ca 6 km nord for Stadsbygd sentrum, og omfatter deler av innmarka vest for Jonslia i Rissa kommune. Omkringliggende arealer består mest av gjødsla eng og løvblandingsskog med innslag av noe eldre gran. Lokaliteten er ca 140 meter lang, og strekker seg i all hovedsak fra nordøst mot sørvest. Lokaliteten er for det meste sørvestvendt og består av en slak skråning med et flatere parti nederst. I følge berggrunnskartet er det glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt som dominerer berggrunnen her. Moen (1998) plasserer lokaliteten i klart oseanisk seksjon (O2). Samme kilde plasserer lokaliteten i mellomboreal vegetasjonssone.

Naturtyper: Lokaliteten er avgrenset som naturbeitemark (D04) (100 %). Vegetasjonen innenfor lokaliteten består mest av svak lågurtbeiteeng (D0415) (50%) i de øvre delene og svak lågurt-beitefukteng (D0418) (50%) i de nedre delene (etter DN-håndbok 13).

Artsmangfold: Lokaliteten er dominert av arter som smalkjempe, blåklokke, småengkall, hvitkløver, tepperot, tveskjeggveronika, ryllik, nyseryllik, prestekrage, engsoleie og sølvbunke. I bunnsjiktet dominerer engkransmose. Funn av en del beitemarkssopp som gul vokssopp, engvokssopp og musserongvokssopp (NT). En vurderer også potensialet for flere arter beitemarkssopp å være til stede her. En del einer og yngre bjørk inngår i lokaliteten.

Påvirkning: Området er beitet med sau og i middels hevd. En del einer og yngre bjørk vitner om begynnende gjengroing.

Fremmede arter: Nyseryllik

Skjøtsel: Det er nødvendig å rydde vekk renninger og kratt for å hindre gjengroing. Beitetrykket må opprettholdes. Skjøtsel ved slått av en del av lokaliteten med etterbeiting vil være positivt. Lokaliteten bør ikke gjødsles, pløyes eller sprøytes.

Landskap: Områdene rundt Jonslia har tidligere trolig vært en del av et større kulturlandskap ved Husbotn. I dag er mye av dette grodd igjen eller tilplantet med gran og tilknytningen til dette landskapet er svekket. Rundt gården i Jonslia er det imidlertid fremdeles beitet med sau både på deler av innmarka og delvis også i skogen.

Mangler:

Totalareal: 6,1 daa

Jonslia

Id	BN00088342
Områdenavn	Jonslia
Kommuner	Indre Fosen
Naturtype	Naturbeitemark
Utforming	Svak lågurtbeitefukteng
Verdi	Viktig
Utvalgt naturtype	Nei
Registreringdato	19.09.2012
Nøyaktighetsklasse	< 20 m
Tilstand	God hevd
MOB-Land prioritet	G Ikke vurdert
Modellert	Nei
Gjennomsnittsdyp	
Forvaltningsplan	Nei
Forvaltningsavtale	0
Forvaltningsavtale inngått	
Forvaltningsavtale utløper	
Bruk	
Påvirkningsfaktor	

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er noe gjengrodd, har middels beitetrykk og lite spor av gjødsling, ingen fremmede arter og har en viss størrelse. Sammen med funn av rødlistet beitemarkssopp gir dette verdien; Viktig – B.

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Solfrid Helene Lien Langmo, Bioreg AS, 05.04.2013, basert på feltarbeid 19.09.2012 av Øystein Folden og Solfrid Helene Lien Langmo. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i forbindelse med supplerende naturtypekartlegging i Rissa kommune. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere.

Beliggenhet: Lokaliteten ligger ca 6 km nord for Stadsbygd sentrum, og omfatter deler av innmarka like nord for tunet i Jonslia i Rissa kommune. Omkringliggende arealer består i all hovedsak av løvbandingsskog med noe innslag av gran, samt gjødsle eng. Lokaliteten er ca 60 meter lang, og utgjør en sørvendt skråning. I følge berggrunnskartet er det glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt som dominerer berggrunnen her. Moen (1998) plasserer lokaliteten i klart oseanisk seksjon (O2). Samme kilde plasserer lokaliteten i mellomboreal vegetasjonssone.

Naturtyper: Lokaliteten er avgrenset som naturbeitemark (D04) (100 %). Vegetasjonen innenfor lokaliteten består, etter DN håndbok 13, av svak lågurtbeiteeng (D0415) (30%) i de midtre delene og svak lågurt-beitefukteng (D0418) (70%) i områdene rundt.

Artsmangfold: Lokaliteten er dominert av arter som blåklokke, småengkall, hvitkløver, tveskjeggveronika, tepperot, prestekrage, engsoleie og sølvbunke. I bunnsjiktet dominerer moser som engkransmose. Funn av en del beitemarkssopp som gul vokssopp, engvokssopp og musserongvokssopp (NT). En vurderer også potensialet for flere arter beitemarkssopp å være til stede her. En del einer og yngre bjørk inngår i de øvre delene av lokaliteten. Etter hvert går området ovenfor lokaliteten over i noe som kan karakteriseres som en beiteskog, uten at denne er undersøkt.

Påvirkning: Området er beitet med sau og i middels hevd. En del einer og yngre bjørk vitner om begynnende gjengroing.

Fremmede arter: Ingen ble observert.

Skjøtsel: Naturverdiene bevares best gjennom beiting, gjerne med noe høyere beiteintensitet enn i dag. Einer og bjørkerenninger bør fjernes. Lokaliteten bør ikke gjødsles, pløyes eller sprøytes.

Landskap: Områdene rundt Jonslia har tidligere trolig vært en del av et større kulturlandskap ved Husbotn. I dag er mye av dette grodd igjen eller tilplantet med gran og tilknytningen til dette landskapet er svekket. Rundt gården i Jonslia er det imidlertid fremdeles beitet med sau både på deler av innmarka og delvis også i skogen.

Mangler:

Totalareal: 1,5 daa

Jonsliåsen

Id	BN00088331
Områdenavn	Jonsliåsen
Kommuner	Indre Fosen
Naturtype	Naturbeitemark
Utforming	Svak lågurteng
Verdi	Viktig
Utvalgt naturtype	Nei
Registreringdato	18.09.2012
Nøyaktighetsklasse	< 20 m
Tilstand	God hevd
MOB-Land prioritet	G Ikke vurdert
Modellert	Nei
Gjennomsnittsdyp	
Forvaltningsplan	Nei
Forvaltningsavtale	0
Forvaltningsavtale inngått	
Forvaltningsavtale utløper	
Bruk	
Påvirkningsfaktor	

Verdibegrunnelse: Området er i drift med middels hevd. Med rimelig stort artsmangfold av karplanter, ingen fremmede arter og med funn av jordtunge blir verdien satt til en sterk; Lokalt viktig – C.

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Solfrid Helene Lien Langmo, Bioreg AS, 05.04.2013, basert på feltarbeid 18.09.2012 av Øystein Folden og Solfrid Helene Lien Langmo. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i forbindelse med supplerende naturtypekartlegging i Rissa kommune. Lokaliteten er ikke kartlagt tidligere.

Beliggenhet: Lokaliteten ligger ca 6 km nord for Stadsbygd sentrum, og omfatter deler av innmarka nord for Jonslia i Rissa kommune. Tilgrensende areal er stort sett granskog i yngre suksesjonsfaser, med noe innslag av boreale lauvtrær, i tillegg til et område med beitemark som nå er grodd igjen med yngre bjørk. Lokaliteten er ca 100 meter lang, og strekker seg i all hovedsak oppover en vestvendt bakke ved veien fra Jonslia mot Månen. I følge berggrunnskartet er det glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt som dominerer berggrunnen her. Moen (1998) plasserer lokaliteten i klart oseanisk seksjon (O2). Samme kilde plasserer lokaliteten i mellomboreal vegetasjonssone.

Naturtyper: Lokaliteten er avgrenset som naturbeitemark (D04) (100 %). Vegetasjonen innenfor lokaliteten består i all hovedsak av Svak lågurtbeiteeng (D0415) (70%) og med overgang mot svak lågurt-beitefukteng (D0418) (30%) etter DN håndbok 13.ArtsmangfoldLokaliteten er dominert av arter som blåklokke, ryllik, svingel-arter, fjøllblom, småengkall, prestekrage og sølvbunke sammen med blant annet smalkjempe. I bunnsjiktet dominerer engkransmose. Funn av en del beitemarkssopp som gul vokssopp, engvokssopp, kjeglevokssopp og ubestemt jordtunge. En vurderer også potensialet for flere arter beitemarkssopp å være til stede her.

Påvirkning: Området er beitet med sau over lang tid, med rimelig godt beite-trykk. Ingen synlige tråkkskader. En avlingsvei tangerer lokaliteten nederst.

Fremmede arter: Ingen ble observert.

Skjøtsel: Naturverdiene bevares best gjennom fortsatt beiting, gjerne med noe høyere beitetrykk. Bjørkerenninger og noe kratt kan med fordel fjernes. Lokaliteten bør ikke gjødsles, pløyes eller sprøytes.

Landskap: Områdene rundt Jonslia har tidligere trolig vært en del av et større kulturlandskap ved Husbotn. I dag er mye av dette grodd igjen eller tilplantet med gran og tilknytningen til dette landskapet er svekket. Rundt gården i Jonslia er det imidlertid fremdeles beitet med sau både på deler av innmarka og delvis også i skogen.

Mangler

Totalareal: 4,4 daa